

Die Impfstoffe von GlaxoSmithKline

Stand: September 2021

Unser **Med Info & Service Center** erreichen Sie Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr (gebührenfrei)
Tel. 0800 1 22 33 55, Fax 0800 1 22 33 66, E-Mail-Adressen: produkt.info@gsk.com, medizin.info@gsk.com

Impfung (Zulassungsalter)	Name des Impfstoffes	Impfschema (Grundimmunisierung und Auffrischung)	Abstände zu anderen Impfungen ● Lagerung*	Packungsgrößen	PZN
Meningokokken B (ab 2 Monate)	BEXSERO	Alter (Impfschema i.m.): 2-5 Monate (2+1): 2x 0,5 ml i.m. im Abstand von mind. 2 Monaten + 1x 0,5 ml i.m. im Alter von 12-15 Monaten, mind. 6 Monate nach der letzten Dosis 2-5 Monate (3+1): 3x 0,5 ml i.m. im Abstand von mind. 1 Monat + 1x 0,5 ml i.m. im Alter von 12-15 Monaten, mind. 6 Monate nach der letzten Dosis 6-11 Monate (2+1): 2x 0,5 ml i.m. im Abstand von mind. 2 Monaten + 1x 0,5 ml i.m. im 2. Lebensjahr, mind. 2 Monate nach der letzten Dosis 12-23 Monate (2+1): 2x 0,5 ml i.m. im Abstand von mind. 2 Monaten + 1x 0,5 ml i.m. mit Abstand von 12-23 Monaten nach der letzten Dosis 2-10 Jahren (2): 2x 0,5 ml i.m. im Abstand von mind. 1 Monat Ab 11 Jahren (2): 2x 0,5 ml i.m. im Abstand von mind. 1 Monat Basierend auf offiziellen Empfehlungen sollte bei Personen mit fortbestehendem Risiko einer Exposition gegenüber Meningokokken-Erkrankungen eine Auffrischimpfung in Betracht gezogen werden.	nicht erforderlich ● bei +2 °C bis +8 °C	1 FS	09461122
Tetanus/Diphtherie/ Pertussis (azellulär) (ab 4 Jahre)	Boostrix	Auffrischung 1x 0,5 ml tief i.m. oder s.c., bei Indikation alle 10 Jahre Erstimmunisierung Kann bei Jugendlichen und Erwachsenen mit unbekanntem / unvollständigem Impfstatus gegen Diphtherie, Tetanus und Pertussis als Teil einer Impfserie verabreicht werden. Impfung in der Schwangerschaft Kann in jeder Schwangerschaft im 3. Trimenon (bei Neigung zu Frühgeburtlichkeit im 2. Trimenon) verabreicht werden.	nicht erforderlich ● bei +2 °C bis +8 °C	1 FS 10x 1 FS	00633923 00633946
Tetanus/Diphtherie/ Pertussis (azellulär) Poliomyelitis (ab 3 Jahre)	Boostrix Polio	Auffrischung 1x 0,5 ml tief i.m. oder s.c., bei Indikation alle 10 Jahre Erstimmunisierung Kann bei Jugendlichen und Erwachsenen mit unbekanntem / unvollständigem Impfstatus gegen Diphtherie, Tetanus, Pertussis und Poliomyelitis als Teil einer Impfserie verabreicht werden. Impfung in der Schwangerschaft siehe Boostrix	nicht erforderlich ● bei +2 °C bis +8 °C	1 FS 10x 1 FS	00762081 00762098
Prävention von prä-malignen anogenitalen Läsionen der Zervix, Vulva, Vagina und des Anus sowie von Zervix- und Analkarzinomen, die durch bestimmte onkogene humane Papillomviren (HPV) verursacht werden. Cervarix sollte gemäß den offiziellen Impfempfehlungen angewendet werden. (bei Personen ab 9 Jahre)	Cervarix	Alter (Impfschema i.m.): 9-14 Jahre (2): 2x 0,5 ml im Abstand von 5-13 Monaten ab 15 Jahre (2+1): 2x 0,5 ml im Abstand von 1 Monat; 1x 0,5 ml 6 Monate nach der ersten Impfung Auffrischung: bislang nicht erforderlich	nicht erforderlich ● bei +2 °C bis +8 °C	1 FS 10x 1 FS	01467160 01467183
Hepatitis B (Jugendliche ab 16 Jahre und Erwachsene)	Engerix-B ERWACHSENE	Grundimmunisierung Standardimpfschema: 2x 1 ml i.m. im Abstand von 4 Wochen; 1x 1 ml i.m. 5 Monate nach der zweiten Impfung Beschleunigtes Impfschema: (ab 18 Jahre) 3x 1 ml i.m. an den Tagen 0, 7, 21; 1x 1 ml i.m. 12 Monate nach der ersten Impfung Auffrischung: Nach erfolgreicher Hepatitis-B-Impfung sind im Allgemeinen keine weiteren Auffrischimpfungen erforderlich, Ausnahme: Personen mit humoraler Immundefizienz, ggf. Personen mit besonders hohem individuellen Expositionsrisiko (genauer siehe STIKO).	nicht erforderlich ● bei +2 °C bis +8 °C	1 FS 10x 1 FS	07504643 07504672
Hepatitis B (Neugeborene und Kinder bis 15 Jahre)	Engerix-B KINDER	Grundimmunisierung: 2x 0,5 ml i.m. im Abstand von 4 Wochen; 1x 0,5 ml i.m. 5 Monate nach der zweiten Impfung Auffrischung: siehe Engerix-B Erwachsene	nicht erforderlich ● bei +2 °C bis +8 °C	1 FS 10x 1 FS	06155413 06155442
Hepatitis B (Jugendliche ab 15 Jahre und Erwachsene, bei Niereninsuffizienz oder Prä-Hämodialyse und Hämodialyse)	Fendrix	Grundimmunisierung: 3x 0,5 ml i.m. im Abstand von jeweils 4 Wochen; 1x 0,5 ml i.m. 6 Monate nach der ersten Impfung Impferfolgskontrolle gemäß STIKO erforderlich (Anti-HBs-Test 4-8 Wochen nach 4. Dosis)	nicht erforderlich ● bei +2 °C bis +8 °C	1 FS	09084837
Hepatitis A (Jugendliche ab 15 Jahre und Erwachsene)	Havrix 1440	Grundimmunisierung: 2x 1 ml i.m. im Abstand von 6-12 Monaten Auffrischung: Vorliegende Daten aus zwei Langzeitstudien über 17 Jahre zur Persistenz der Hepatitis-A-Antikörper (Anti-HAV) nach 2 Dosen Havrix 1440, die im Abstand von 6 bis 12 Monaten gesunden Erwachsenen bis 40 Jahre verabreicht wurden, erlauben anhand mathematischer Modellierung die Annahme, dass mindestens 95 % der Geimpften 30 Jahre nach der Impfung und mindestens 90 % der Geimpften 40 Jahre nach der Impfung seropositiv (≥ 15 mI.E. Anti-HAV/ml) bleiben.	nicht erforderlich ● bei +2 °C bis +8 °C	1 FS 10x 1 FS	04935377 04935383
Hepatitis A (Kinder und Jugendliche ab 1 Jahr bis 14 Jahre)	Havrix 720 KINDER	Grundimmunisierung: 2x 0,5 ml i.m. im Abstand von 6-12 Monaten Auffrischung: siehe Havrix 1440	nicht erforderlich ● bei +2 °C bis +8 °C	1 FS	07728093
Tetanus/Diphtherie/ Pertussis (azellulär) inaktivierte Poliovakzine (IPV)/ Haemophilus influenzae Typ b (Hib) (ab 2 Monate bis 36 Monate)	Infanrix-IPV+Hib	Grundimmunisierung: 3+1 (für Frühgeborene* empfohlen): 3x 0,5 ml i.m. im Abstand von 4 Wochen STIKO: im Alter von 2, 3 und 4 Monaten 2+1: 2x 0,5 ml i.m. im Abstand von mind. 2 Monaten STIKO: im Alter von 2 und 4 Monaten Auffrischung: 3+1 (für Frühgeborene* empfohlen): 1x 0,5 ml i.m. ab 12 bis 14 Monate bei einem Mindestabstand zur 3. Dosis von 6 Monaten 2+1: 1x 0,5 ml i.m. ab 12 bis 14 Monate bei einem Mindestabstand zur 2. Dosis von 6 Monaten. STIKO: 1x 0,5 ml i.m. im Alter von 11 Monaten, frühestens 6 Monate nach der letzten Dosis der Grundimmunisierung. Die Impfserie soll vor dem 1. Geburtstag abgeschlossen sein.	nicht erforderlich ● bei +2 °C bis +8 °C Nach Rekonstitution: Haltbarkeit bei +2 °C bis +8 °C max. 8 Std.	1 Dosis 10x 1 Dosis	08627715 08627721
Tetanus/Diphtherie/ Pertussis (azellulär) Hepatitis B/inaktivierte Poliovakzine (IPV)/Haemophilus influenzae Typ b (Hib) (ab 6 Wochen bis 36 Monate**)	Infanrix hexa	Grundimmunisierung: 3+1 (für Frühgeborene* empfohlen): 3x 0,5 ml i.m. im Abstand von 4 Wochen STIKO: im Alter von 2, 3 und 4 Monaten 2+1: 2x 0,5 ml i.m. im Abstand von mind. 2 Monaten STIKO: im Alter von 2 und 4 Monaten Auffrischung: 3+1 (für Frühgeborene* empfohlen): 1x 0,5 ml i.m. ab 12 bis 14 Monate bei einem Mindestabstand zur 3. Dosis von 6 Monaten STIKO: 1x 0,5 ml i.m. im Alter von 11 Monaten, frühestens 6 Monate nach der letzten Dosis der Grundimmunisierung. Die Impfserie soll vor dem 1. Geburtstag abgeschlossen sein.	nicht erforderlich ● bei +2 °C bis +8 °C Vor Rekonstitution: nachgewiesene Thermostabilität für 72 Std. bis 25 °C*** Nach Rekonstitution: Haltbarkeit bei Raumtemperatur (21 °C) bis zu 8 Std.	1 Dosis 10x 1 Dosis 50x 1 Dosis	00977060 00977077 10538539
Tetanus/Diphtherie/ Pertussis (azellulär) (ab 2 Monate bis zum vollendeten 6. Lebensjahr)	Infanrix	Grundimmunisierung: 3x 0,5 ml i.m. im Abstand von 4 Wochen Auffrischung: 1x 0,5 ml i.m. ab 12 bis 14 Monate bei einem Mindestabstand zur 3. Dosis von 6 Monaten	nicht erforderlich ● bei +2 °C bis +8 °C	1 FS	08706113
Influenza 2 Influenza-A-Subtypen und 2 Influenza-B-Linien (ab 6 Monate)	Influsplit Tetra	Impfschema: 1x 0,5 ml i.m.; Kinder unter 9 Jahren, die zuvor nicht geimpft worden sind, sollten nach mind. 4 Wochen eine zweite Dosis bekommen jährliche Nachimpfung: 1x 0,5 ml i.m. mit aktuellem Impfstoff	nicht erforderlich ● bei +2 °C bis +8 °C	1 FS 10 x 1 FS	16807466 16807472
Meningokokken C (ab 2 Monate)	MENJUGATE	Grundimmunisierung: Säuglinge: 2x 0,5 ml i.m. im Abstand von mind. 2 Monaten; ab 12 Monate: 1x 0,5 ml i.m. Auffrischung: 1x 0,5 ml i.m. bei Grundimmunisierung im 1. Lebensjahr, sonst keine	nicht erforderlich ● bei +2 °C bis +8 °C	1 Dosis 10x 1 Dosis	11116289 11116303
Meningokokken ACWY (ab 2 Jahre)	MENVEO	Grundimmunisierung: 1x 0,5 ml i.m. Auffrischung: Langzeitdaten bis zu 5 Jahre nach Impfung verfügbar. Notwendigkeit sowie Zeitpunkt für eine Auffrischimpfung entsprechend den nationalen Empfehlungen. Bei erhöhtem Risiko einer Exposition gegenüber Men A siehe Fachinformation Abschnitt 4.4.	nicht erforderlich ● bei +2 °C bis +8 °C	1 Dosis	09223492
Masern, Mumps und Röteln (ab 9 Monate)	Priorix	Grundimmunisierung: 10 Monate: 2x 0,5 ml i.m. oder s.c. im Abstand von mind. 4 Wochen Erwachsene: gemäß STIKO-Empfehlung	Gleichzeitig oder im Abstand von mind. 4 Wochen zu Lebendimpfstoffen 3 Monate nach Immunglobulingabe ● bei +2 °C bis +8 °C Nach der Rekonstitution: max. 8 Std. bei +2 °C bis +8 °C	1 Dosis 10x 1 Dosis	08627744 08627750
Masern, Mumps, Röteln und Windpocken (Varizellen) (ab 11 Monate) ab 9 Monaten bei entsprechender epidemiologischer Situation	Priorix-Tetra	Grundimmunisierung: 2x 0,5 ml i.m. oder s.c. im Abstand von vorzugsweise 6 Wochen bis 4 Monate (mindestens jedoch 4 Wochen) Erwachsene: gemäß STIKO-Empfehlung	Gleichzeitig oder im Abstand von mind. 4 Wochen zu Lebendimpfstoffen 3 Monate nach Immunglobulingabe ● bei +2 °C bis +8 °C Nach der Rekonstitution: max. 24 Std. bei +2 °C bis +8 °C	1 Dosis 10x 1 Dosis	03754567 03754656
Rotaviren (ab 6 Wochen bis 24 Wochen)	Rotarix	Grundimmunisierung: 2x 1,5 ml (Schluckimpfung) im Abstand von mind. 4 Wochen; Empfohlenes Alter bei Abschluss der Impfserie: 16 Wochen, maximal 24 Wochen	nicht erforderlich ● bei +2 °C bis +8 °C	Tube: 1 Dosis 10x 1 Dosis	12743189 12743195
Gürtelrose / Herpes Zoster (ab 50 Jahren)	Shingrix	Grundimmunisierung: 2x 0,5 ml i.m. im Abstand von 2 Monaten (spätestens 6 Monate nach der 1. Dosis) Zur Notwendigkeit von Auffrischimpfungen nach Abschluss der Grundimmunisierung liegen keine Daten vor.	nicht erforderlich ● bei +2 °C bis +8 °C	1 Dosis: 2 Durchstechflaschen (Pulver und Suspension zur Rekonstitution) 10 Dosen	13715870 13715887
Pneumokokken (ab 6 Wochen bis 4 Jahre)	Synflorix	Alter (Impfschema i.m.): 2 Monate - 6 Monate (2+1): 2x 0,5 ml im Abstand von 2 Monaten; 1x 0,5 ml mind. 6 Monate nach der letzten Dosis 6 Wochen - 6 Monate (3+1): 3x 0,5 ml im Abstand von mind. je 1 Monat; 1x 0,5 ml mind. 6 Monate nach der letzten Dosis 7 Monate - 11 Monate (2+1): 2x 0,5 ml im Abstand von mind. 1 Monat; 1x 0,5 ml mind. 2 Monate nach der letzten Dosis 1-4 Jahre (2): 2x 0,5 ml im Abstand von mind. 2 Monaten	nicht erforderlich ● bei +2 °C bis +8 °C	1 FS 10x 1 FS	06798275 06798281
Hepatitis A und Hepatitis B (ab 16 Jahre)	Twinnix ERWACHSENE	Grundimmunisierung Standardimpfschema: 2x 1 ml i.m. im Abstand von 4 Wochen; 1x 1 ml i.m. 5 Monate nach der zweiten Impfung Beschleunigtes Impfschema: (ab 18 Jahre) 3x 1 ml i.m. an den Tagen 0, 7, 21; 1x 1 ml i.m. 12 Monate nach der ersten Impfung Auffrischung Nach erfolgreicher Hepatitis-B-Impfung sind im Allgemeinen keine weiteren Auffrischimpfungen erforderlich, Ausnahme: Personen mit humoraler Immundefizienz, ggf. Personen mit besonders hohem individuellen Expositionsrisiko (Genauer siehe STIKO). Ergebnisse aus Langzeitstudien über 17 Jahre zur Persistenz der Hepatitis-A-Antikörper nach einer vollständigen Hepatitis A Immunisierung, die im empfohlenen Abstand gesunden Erwachsenen bis 40 Jahre verabreicht wurden, erlauben die Annahme, dass mindestens 95 % der Geimpften 30 Jahre nach der Impfung und mindestens 90 % der Geimpften 40 Jahre nach der Impfung seropositiv bleiben.	nicht erforderlich ● bei +2 °C bis +8 °C	1 FS 10x 1 FS	08926429 08926435
Hepatitis A und Hepatitis B (ab 1 Jahr bis 15 Jahre)	Twinnix KINDER	Grundimmunisierung 2x 0,5 ml i.m. im Abstand von 4 Wochen; 1x 0,5 ml i.m. 5 Monate nach der zweiten Impfung Auffrischung siehe Twinnix Erwachsene	nicht erforderlich ● bei +2 °C bis +8 °C	1 FS 10x 1 FS	07728070 07728087
Windpocken (Varizellen) (ab 9 Monate)	Varilrix	Grundimmunisierung: Kinder im Alter von 9 bis einschließlich 11 Monaten: 2x 0,5 ml s.c. oder i.m. im Abstand von mindestens 3 Monaten Kinder ab einem Alter von 12 Monaten, Jugendliche und Erwachsene: 2x 0,5 ml s.c. oder i.m. in der Regel im Abstand von 6 Wochen, jedoch mindestens 4 Wochen	Gleichzeitig oder im Abstand von mind. 4 Wochen zu Lebendimpfstoffen 3 Monate nach Immunglobulingabe ● bei +2 °C bis +8 °C Verwendung von resuspendiertem Impfstoff bei +25 °C bis max. 90 Min bei +2 °C bis +8 °C max. 8 Std.	1 Dosis 10x 1 Dosis	0695421 03709242

IMPFSTOFFE

GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG
Brinzensgürtelplatz 9
81675 München

www.gskpro.de
www.GlaxoSmithKline.de
www.impfakademie.de
www.gsk-arbeitsmedizin.de
www.gesundes-kind.de
www.impfen.de
www.fit-for-travel.de

Abkürzungen:
Std. = Stunde
PZN = Pharma-Zentral-Nummer
FS = Fertigspritze ohne Kanüle

STIKO = Ständige Impfkommission am Robert Koch-Institut

* = nicht einfrühen
** = Ab 6 Wochen soweit bei Geburt mit Hep B geimpft; Abschluss der Impfserie bis zum 36. Monat; Impfschemata nach offiziellen Empfehlungen
*** = Daten sind nur dazu bestimmt, eine Anleitung bei vorübergehenden Temperaturabweichungen zu geben
1 = vor der vollendeten 37. Schwangerschaftswoche geboren



